

Наименование	Кол-во	Лекарственная форма	Дозировка	Глюкокортикоиды	Применение	Сочетание
Дексаметазон	10 шт	Ампулы(1 ампула-4мг-1мл)	20 мг в/в однократно В зависимости от веса и ситуации		20 мг в/в (5 ампул) при: анафилактическом/травматическом шоке бронхиальной астме (сначала 2 ампулы, смотришь на состояние) отек мозга	С НПВС сочетать нежелательно, но можно. При применении всегда в комплексе с омезом Суточная доза max 80 мг
Боль и температура						
Ибуклин		0 Таблетки	1 табл до 4 раз в сутки (после еды)		Боль и температура	Применение ибуклина вместе с дексалгином требует омеза
Дексалгин(25 мг)		0 Таблетки	1 табл до 2 раз в сутки (после еды)		НПВС	
Диклофенак (5%)	1 уп	Гель	2-3 раза в сутки		Обезболивающее, противовоспалительное. Для колен.	
Диклофенак	10 шт	Ампулы(1ампула - 75 мг - 3 мл)	По 1 ампуле. Вторая доза через 12 часов и более. Не больше 2 дней		Боль, особенно в суставах	Суточная доза max 150 мг
Кетанов	10 шт	Ампулы(1 ампула-30мг-1мл)	10-30 мг в/м каждые 4-6 часов не больше 2 дней, в сутки до 90 мг		При очень сильных болях, некупирующихся пероральным введением	Применение параллельно с ибуклином и дексалгином требует омеза
Дротаверин	9 шт	Таблетки	1-2 табл 2-3 раза в сутки		При болях , вызванных спазмами	
Антибиотики						
Сумамед(Азитромицин) (500 мг)	2 уп(3 шт)	Таблетки	1 раз в сутки 1 табл(500мг), курс - 3 дня, за 1 час до или через 2 после еды		Бактериальные заболевания	
Доксициклин(100мг)	16 шт	Капсулы	2 раза в стуки по 1 табл, 7 дней. Первый день - удвоенная доза		Профилактика боррелиоза	
Йодантипирин(100 мг)	1 уп(50 шт)	Таблетки	Первые 2 дня - по 3 табл 3 р в день След 2 дня - по 2 табл 3 р в день След 5 дней - по 1 табл 3 р в день		Профилактика клещевого энцефалита	
Антигистаминные						
Лоратадин	9 шт	Таблетки	1 табл 3-4 раза в сутки		Аллергия	Усиливает эффект анальгетиков (ибуклин, кетанов)
Ухо-горло-нос-глаза						
Окомистин	1 уп	Раствор	Промывать 3-4 раза в сутки		Антисептик, при воспалении, загрязнении глаз	
Кандибиотик(5мл)	1 уп	Капли	4-5 капель 3-4 раза в сутки		Воспалительные заболевания ушей	
Стоптуссин	18 шт	Таблетки	1-2 табл 3 раза в сутки		Кашель	
Стопангин	1 уп	Спрей	3-4 раза в сутки		Антисептик для горла	
Ксилометазолин(10мл)	1 уп	Спрей	3 раза в день		Насморк	
ЖКТ						
Активированный уголь	20 шт	Таблетки	1 таблетка на 15 кг веса		Антитоксический эффект, отравления	
Нифуроксазид(200 мг)	36 шт	Капсулы	1 табл 4 раза в сутки		Диарея, вызванная бактериальной инфекцией	
Омез(20мг)	20 шт	Капсулы	По симптомам/при приеме НПВС		Изжога, профилактика язвы при приеме антибиотиков	
Лоперамид	18 шт	Таблетки/Капсулы	2 табл, затем по 1 после каждого акта дефекации		Диарея	
Гутталакс	9 шт	Таблетки	Индивидуально, внутрь перед сном		Запор	
Антисептики, противомикробные						
Перекись водорода	100 мл	Раствор			Обработка раны	
Банеоцин(10г)	1 уп	Порошок			Обработка мокнущих ран, гнойников	
Тридерм	1 уп	Мазь			Потертости, царапины, ожоги и тд	
Бетадин	1 уп	Раствор			Обработка раны	
Давление						
Лазикс	5 шт	Таблетки	1-2 таблетки 1 раз в сутки, нощолак		Мочегонное(понижает давление)	
Перевязка и прочее						
Шприц 5 мл	16 шт					
Пилка для ампул	1					
Бинт стерильный 7x14	5					
Ватные диски	27					
Салфетки стерильные (большие)	2 уп					
Маркер перманентный	1					
Лейкопластырь рулонный	1					
Перчатки медицинские	2					
Лейкопластырь бактерицидный(большой)	5					
Жгут для в/в инъекций	1					
Спиртовые салфетки	20 шт					
Лейкопластырь маленький	10 шт					
Хладопакет	3 шт					
Ватные палочки	9 шт					
Пинцет	1 шт					
Ножницы	1 шт					
Шприц 20 мл	1 шт					
Салфетка противоожоговая	3 шт					