

Наименование препарата	Тип	Применение	Форма	Количество
Перевязочные средства				
Бинты стер. 7x14	Перевязочное средство		штука	3
Бинты стер. 5x10	Перевязочное средство		штука	2
Салфетки спиртовые мал.	Перевязочное средство		штука	10
Пластырь бактерицидный	Перевязочное средство		Штука	10
Пластырь	Перевязочное средство		рулон	1 шт
Кинезиотейп	Перевязочное средство		штука	1
Бинт эластичный	Перевязочное средство		штука	1 шт
Йод	Антисептики		Раствор 5%	10мл
Хлоргексидин	Антисептики		Раствор 0,05%	400 мл
Спирт	Антисептики			100мл
Антибиотики, противовирусные				
Амоксилав	Антибиотики (бактерицидный)	Взрослым и подросткам старше 12 лет по 250 мг/125 мг 3 раза в сутки. При тяжелом течении инфекций — 500 мг/125 мг 3 раза в сутки или по 1000 мг/250мг 2 раза в сутки. С целью снижения риска развития побочных эффектов со стороны ЖКТ следует принимать препарат во время еды. (бактериостатические ЛС (макролиды, хлорамфеникол, линкозамиды, тетрациклины, сульфаниламиды) — антагонистическое. Противопоказания: инфекционный мононуклеоз. С осторожностью: заболевания ЖКТ, хроническая почечная недостаточность)	Таблетки 875+125мг	10шт
Йодантипирин	Противовирусное (энцефалит)	Внутрь, после еды. Для лечения клещевого энцефалита: в первые 2 дня - по 0.3 г 3 раза/сут; в третий и четвертый дни - по 0.2 г 3 раза/сут; в последующие 5 дней - по 0.1 г 3 раза/сут.	таблетки	45 шт
Антигистаминные				
Лоратадин	Антигистаминные		Таблетки	20
Кетотифен	Антигистаминные	1 табл. 2 р/д во время еды	Таблетки	20
Желудочные				
Активиров. Уголь	Желудочно-кишечные		Упаковка (блистер)	12

Смектит	Желудочно-кишечные	Для взрослых содержимое пакетиков растворяют в 1/2 стакана воды, постепенно высыпая порошок и равномерно его размешивая. Назначенную дозу распределяют на 3 приема в течение дня. При острой диарее 6 пак/сут. При прочих заболеваниях 3 пак/сут	порошок в пакетиках	20
Лоперамид	Желудочно-кишечные		таблетки	40
Энтерофурил	Желудочно-кишечные		Капсулы	64
Пикодинар	Желудочно-кишечные	Слабительное. Взрослым и подросткам в возрасте старше 10 лет обычно назначают по 13-27 капель препарата 1 раз в сутки. Не следует принимать препарат более 3 дней подряд. препарат в форме капель для перорального применения противопоказан пациентам, страдающим непереносимостью фруктозы.	Капли	1
Омепразол	Желудочно-кишечные	При язвах желудка и двенадцатиперстной кишки, тошноте, изжоге, 20 мг 1 раз в сутки. Внутрь, предпочтительно утром до еды, не разжевывая, не измельчая и не повреждая капсулу, запивая небольшим количеством жидкости (возможен прием с пищей).	Капсулы	10
Регидрон	Желудочно-кишечные	Содержимое одного пакетика растворяют в 1 л охлажденной воды, принимают в течение дня.	Порошок для приготовления раствора	8 шт
Инструменты				
Пинцет	Инструменты			1 шт
Ножницы	Инструменты			1 шт
Градусник	Инструменты			1 шт
Пинцет для клещей	Инструменты			1 шт
Пипетка	Инструменты			1 шт
Перчатки	Инструменты			2 шт
Жгут	Инструменты			1 шт
Шприц 2мл	Инструменты			10 шт
Мази				
Боро плюс	Мази		Туба	1
Левомеколь	Мази	Гнойные раны (в т.ч. инфицированные смешанной микрофлорой) в первой (гнойно-некротической) фазе раневого процесса, Препаратом пропитывают стерильные марлевые салфетки, которыми рыхло заполняют рану.Перевязки производят ежедневно, до полного очищения раны от гнойно-некротических масс.	Туба	1

Д-Пантенол	Мази	Сухость кожи; нарушение целостности кожных покровов: мелкие повреждения, ожоги (в том числе солнечные), ссадины, буллезный дерматит, абсцесс, наносят тонким слоем на пораженный участок, слегка втирая, 2-4 раза/сут (при необходимости чаще). В случае нанесения на инфицированную поверхность кожи ее следует предварительно обработать антисептиком.	Туба	1
Спасатель	Мази		Туба	1
Диклофенак 5%	Мази		Туба	1
Ацикловир	мазь		туба	5мг, 1 шт
Индовазин	Мазь	(индометацин+троксерутин) Закрытые травмы и ушибы. НПВС+ангиопротектор, НЕ наносить в открытые раны!	туба	1
Обезболивающие, жаропонижающие				
Но-шпа (дротаверина гидрохлорид)	Обезболивающие, жаропонижающие, спазмолитические	При спазмах ЖКТ, Внутрь, взрослым — по 40-90 мг 3 раза в сутки	Упаковка (блистер)	1
Ибуклин	Обезболивающие, жаропонижающие, спазмолитические	(парацетамол + ибупрофен), до или через 2–3 ч после еды, не разжевывая, запивая достаточным количеством воды. Взрослые. По 1 табл. 3 раза в сутки. Максимальная суточная доза — 3 таблетки. Длительность лечения не более 3 дней в качестве жаропонижающего средства и не более 5 дней в качестве обезболивающего.	таблетки	20
Кетонал	Обезболивающие, жаропонижающие, спазмолитические	проглатывать целиком, не измельчая какими-либо способами, запивая достаточным количеством воды. Рекомендуется принимать во время или сразу после еды. Обычные таблетки в оболочке Кетонал – по 1 штуке по 2 раза в сутки; Таблетки пролонгированного действия Кетонал – по 1 штуке один раз в сутки	таблетки	10
Нимесулид	Обезболивающие, жаропонижающие, спазмолитические	Сильное жаропонижающее. Обезболивающее при зубной боли.	гранулы для приготовления суспензии	8
Кетонал	Обезболивающие, жаропонижающие, спазмолитические		Ампула 2мг	5
Мовалис	НПВС	Боли в суставах. Лучше для ЖКТ чем Диклофенак. Максимальная рекомендуемая суточная доза - 15 мг. Не следует применять препарат одновременно с другими НПВП.	таблетки 15мг	20

Диклофенак	Обезболивающие, жаропонижающие, спазмолитические	Вводят глубоко в/м. Разовая доза - 75 мг (1 ампула). При необходимости возможно повторное введение, но не ранее, чем через 12 ч. Длительность применения не более 2 дней. В тяжелых случаях в виде исключения, могут быть проведены 2 инъекции по 75 мг, с интервалом в несколько часов (вторую инъекцию следует проводить в противоположную ягодичную область)	ампула 3мг	5
ЛОР органы, глаза				
Амброксол	При заболеваниях дыхательных путей	Муколитик, 45 мг/сут, 2-3 раза/сут в разделенных дозах	таблетки	20
Фарингосепт	При заболеваниях дыхательных путей		Упаковка (блистер)	2шт
Ксилометазолин	Насморк, сосудосуживающее		капли	10мл
Визин	Глазные капли		капли	15мл
Дикло-Ф	Глазные капли		капли	5мл
Прочее				
Панангин	Калий+магний	1 табл. утром и вечером, если сводит мышцы.		20 табл
Диакarb	Диуретик, противоотечный, снижение внутричерепного давления. При горной болезни.	Профилактика горной болезни. 500-1000 мг/день в равных дозах. При профилактике за 24 часа до восхождения, при лечении прием 48 часов. Параллельно панангин 1-2 табл. 2-3 р/день. Увеличить прием воды.	таблетки	