от чего	средство	кол-во	инструкция по применению
перевязочные	бинт стерильный 7х14 см	4 шт	
	салфетки марлевые стерильные 16х14 см	4 упак (в упак. 10 шт.)	
	салфетки марлевые стерильные 5х5 см	4 упак (в упак. 10 шт.)	
	пластырь рулонный 3 см	1 шт	
	пластырь бактерицидный 2,3 х7,2 см (пластиночки)	12 шт	
	пластырь бактерицидный 1,9 х7,2 см (пластиночки)	7 шт	
	жгут	1 шт	
	ножницы маленькие	1 шт	
	ватные палочки	20 шт	
	перчатки	3 пары	
кровоостанавливающие, ранозаживляющие, антисептики	хлоргексидин 0,05%	1 флакон (100 мл)	антисептик, обработка порезов, ран, с целью дезинфекции. можно применять на слизистых.
	перекись водорода	1 флакон (100 мл)	антисептик, обработка порезов, ран, с целью дезинфекции. **на слизистых оболочках тела применять нельзя**
	зелёнка (флакон с лопаткой)	1 шт	обработка небольших ссадин, порезов, краёв ран
	клей БФ-6	1 шт	обработка микротравм (небольших ссадин, порезов, царапин), способствует заживлению, образует защитную пленку
	бранолинд Н мазевая повязка 7,5х10 см	2 шт	восстановление кожных покровов при ранах, порезах, ссадинах, ожогах, ушибах. повязка накладывается непосредственно на рану, сверху накладывается стерильная впитывающая повязка (марлевая салфетка+бинт). обноляется при каждой смене повязки.
	мазь левомеколь	1 шт	**Показания:** противомикробное при гнойных ранах, открытых ранах, ожогах. **Применение:** местно, пропитать препаратом марлевые салфетки, рыхло заполнить рану. Смена перевязки раз в день, до полного очищения раны от гнойно-некротических масс. **Протвопоказания:** повышенная чувствительность к диоксометилтетрагидропиримидину, хлорамфениколу.
	фурацилин в таблетках 20 мг	8 таблеток	**Показания:** наружно: гнойные раны, ожоги 2-3 степени, ссадины, царапины, трещины, порезы. местно: блефарит, конъюктивит, острый тонзиллит, стоматит (воспаление ротовой полости), воспалении десен, ангина, гайморит. **Применение:** водный раствор, 1 таблетка 20 мг+100 мл теплой кипяченной воды. Орошение ран, наложение владжных повязок, закапывание в конъюктивальный мешок, полоскание рта и горла (2-3 раза в день).

от чего	средство	кол-во	инструкция по применению
	губка коллагеновая кровоостанавливающая	1 шт	**Показания:** капиллярные кровотечения, кровотечения печени, селезёнки, почек, лёгких. **Примение:** наложить на кровоточащее место, прижать в течение 1-2 минут или плотно тампонировать кровоточащую поверхность с последующим бинтованием. **Противопоказания:** артериальное кровотечение, гнойные раны, гнойные инфекции кожи, непереносимость препаратов нитрофуранового ряда.
	салфетки спиртовые	5 шт	
	пластырь нетканный фиксирующий omnifix 10 смх10 м	отрезок	
от ушибов, растяжений,	гель Долонит	1 шт	**Показания:** отёки, гематомы, воспаления мягких тканей, мышц, связок после ушибов, травм; травмы суставов с повреждением связок; воспаление сухожилий; острая невралгия. **Применение:** наносить 2-4 раза в сутки в течение 7 дней или до исчезновения симптомов. **Противопоказания:** бронхиальная астма, выраженные нарушения сердечно-сосудистой системы, повышенная чувствительность к гепарину натрия, декспантенолу, диметилсульфоксиду
	пакет гипотермический «снежок»	1 шт	
	эластичный бинт 2мх8см	1 шт	
	градусник некстемп	1 шт	
	парацетамол	10 шт	**Показания:** Жаропонижающее при ОРЗ и других инфекционно-воспалительных заболеваниях, сопровождающихся повышением температуры. Обезболивающее при слабом и умеренном болевом синдроме: артралгия, миалгия, невралгия, мигрень, зубная и головная боль, альгодисменорея, боль при травмах и ожогах. **Применение:** 500 мг-1 г 1-4 раза в сутки (по необходимости) через 1-2 часа после еды, запивая большим кол-вом воды. **Макс. суточная доза 4 г, макс. разовая доза 1 г.** Интервал между приемами не менее 4 часов. В кач-ве жаропонижающего – не более трех дней, в кач-ве обезболивающего – не более 5 дней.

от чего	средство	кол-во	инструкция по применению
от простуды	амброксол 30 мг	10 таблеток	**Показания:** Острый и хронический бронхит, пневмония, бронхиальная астма, сопровождающиеся образованием трудноотделяемой мокроты. **Применение:** после еды, с достаточным кол-вом жидкости, 1 табл. 30 мг 3 раза в сутки в течение первых 2-3 дней, затем 1 таблетка 2 раза в сутки. Не более 4-5 дней. Не принимать перед сном. При бронхиальной астме может усиливать кашель. Не принимать одновременно с противокашлевыми препаратами, которые тормозят кашлевой эффект. **Противопоказания:** дефицит лактазы, **непереносимость лактозы. С осторожностью:** при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, в т.ч. в анамнезе, нарушение моторики бронхов и увеличение секреции слизи.
	граммидин/суприма лор	10 таблеток	**Показания:** симптоматическое лечение инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки. **Применение:** 1 таблетка каждые 2 часа, не более 8 в сутки. Таблетки рассасываются.
	нафтизин реневал 0,1%	1 флакон	**Показания:** острый ринит, аллергический ринит, остановка носовых кровотечений. Противопоказания: повышенное давление, выраженный атеросклероз, хронический ринит, тяжелые заболевания глаз, сахарный диабет, тахикардия. **Применение:** 1-3 капли 3-4 раза в сутки, не более 5-7 дней. При носовых кровотечениях – тампоны, смоченные 0,05% препаратом.
	активированный уголь	25 таблеток	**Показания:** Экзогенные и эндогенные интоксикации различного происхождения (в качестве детоксицирующего средства). Пищевые токсикоинфекции, дизентерия, сальмонеллез (при комплексном лечении). Отравления лекарственными препаратами (психотропными, снотворными, наркотическими), алкалоидами, солями тяжелых металлов и другими ядами. Заболевания желудочно-кишечного тракта, сопровождающиеся диспепсией и метеоризмом. Пищевая и лекарственная аллергия. **Применение:** 4-8 таблеток, 3-4 раза в сутки, за 1-2 часа до или после еды и приема других лекарственных средств. Максимальная разовая доза для взрослых до 8,0 г (16 таблеток). Курс лечения при острых заболеваниях составляет 3-5 дней, при аллергии и хронических заболеваниях - до 14 дней.

от чего	средство	кол-во	инструкция по применению
от отравлений	смекта	5 пакетиков	**Показания:** - симптоматическое лечение хронической функциональной диареи; - симптоматическое лечение боли, связанной с функциональными заболеваниями кишечника. **Применение:** 3 пакетика в сутки в течение 7 дней, пакетик суспензии размять перед открытием, доведя до жидкого состояния. Содержимое пакетика может быть проглочено неразведенным, или смешано с небольшим количеством воды перед приемом. Предпочтительно принимать между приемами пищи.
	экофурил	10 таблеток	**Показания:** Острая бактериальная диарея, протекающая **без** ухудшения общего состояния, повышения температуры тела, интоксикации. **Применение:** 1 капсула по 200 мг 4 раза в сутки, интервал между приемами 6 ч. 5-7 дней, не более 7 дней. Если в течение первых 3 дней улучшения не наступило, следует обратиться к врачу.
от аллергии	цетрин	10 таблеток	**Показания:** -сезонный и круглогодичный аллергический ринит; -аллергический конъюнктивит; -поллиноз (сенная лихорадка); -крапивница, в том числе хроническая идиопатическая крапивница; -зудящие аллергические дерматозы (атопический дерматит, нейродермит); -ангионевротический отек (отек Квинке). **Применение:** 1 таблетка 10 мг, 1 раз в день, не разжевывая, запивая 200 мл воды
	супрастин	9 таблеток	**Показания:** Крапивница, сывороточная болезнь, сезонный и круглогодичный аллергический ринит, аллергический конъюнктивит, контактный дерматит, кожный зуд, острая и хроническая экзема, атопический дерматит, пищевая и лекарственная аллергия, аллергические реакции на укусы насекомых. **Применение:** во время еды, запивая водой, по 1 таблетке 3-4 раза в день (75-100 мг в сутки). **Противоказания:** острый приступ бронхиальной астмы, дефицит лактазы, непереносимость лактозы. **С осторожностью:** при нарушении функции печени и/или почек, сердечно-сосудистой системы, при закрытоугольной глаукоме, задержке мочи, гиперплазии предстательной железы.

от чего	средство	кол-во	инструкция по применению
обезболивающие	спазмалгон	10 шт	**Показания:** Болевой синдром умеренной или слабой выраженности: головная, зубная боль, мигрень, невралгия, миалгия, артралгия, альгодисменорея, боль при травмах и ожогах. **Применение:** после еды, не разжевывая, запивая водой, 1-2 таблетки 2-3 раза в сутки. Суточная доза не должна превышать 6 таблеток. Продолжительность приема не должна превышать 5 дней. **Противопоказания:** непереносимость лактозы
	кетолор экспресс	18 шт	Применение: однократно или повторно в зависимости от тяжести болевого синдрома. Однократная доза - 10 мг, при повторном приеме рекомендуется принимать по 10 мг до 4-х раз в сутки, в зависимости от выраженности боли; максимальная суточная доза не должна превышать 40 мг. Продолжительность курса – не более 5 дней.
	найз	4 шт	**Показания:** -ревматоидный артрит; -суставной синдром при обострении подагры; -остеохондроз с корешковым синдромом; -остеоартроз; -миалгия ревматического и неревматического генеза; -воспаление связок, сухожилий, бурситы, в том числе посттравматическое воспаление мягких тканей; -болевой синдром различного генеза (в том числе в послеоперационном периоде, при травмах, альгодисменорея, зубная боль, головная боль, артралгия, люмбоишалгия). **Применение:** с достаточным количеством воды предпочтительно после еды, внутрь по 1 таблетке 2 раза в сутки, максимальная суточная доза - 200 мг.
	нимесил	5 пакетиков	**Показания:** - Острая боль (боль в спине, пояснице; болевой синдром в костно-мышечной системе, включая ушибы, растяжения связок и вывихи суставов; тендиниты, бурситы: зубная боль); - симптоматическое лечение остеоартроза (остеоартрита) с болевым синдромом. **Применение:** Содержимое пакетика растворяют в 100 мл воды комнатной температуры, по 1 пакетику два раза в сутки, после еды. **С осторожностью**: Артериальная гипертензия, сахарный диабет, компенсированная сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, заболевания периферических артерий, курение.

от чего	средство	кол-во	инструкция по применению
	цитрамон	10 шт	**Применение:** Внутрь (во время или после еды) по 1-2 таблетки 2-3 раза в день. Перерыв между приемами препарата должен быть не менее 4 часов. Средняя суточная доза - 3-4 таблетки, максимальная суточная доза - 8 таблеток. Курс лечения - не более 7-10 дней. Препарат не следует принимать более 5 дней в качестве анальгезирующего лекарственного средства и более 3 дней - жаропонижающего
от натирания	мазь бороплюс 50 мл	1 шт	
от переохлаждения	спасодеяло серебрянное	2 шт	
клещи	клещевыдергиватель	1 шт	
для глаз	капли глазные сульфацил натрия	1 шт	**Применение:** По 1-2 капли в конъюнктивальный мешок 6-8 раз в день (каждые 2-3 часа). Курс лечения 7-10 дней.
от простуды на губах	ацикловир 5% 10 г	1 шт	
от обезвоживания	регидрон	5 пакетиков	
от ожогов	декспантенол	1 тюбик	**Показания:** заживление ожогов (в т.ч. солнечных), мелких повреждений кожи (ссадины, порезы, трещины и пр.). Профилактика и лечение сухости кожи, в том числе и как последствие дерматитов различного генеза (проявляющихся шелушением, покраснением, раздражением, чувством стянутости). **Применение:** Мазь наносят тонким слоем на пораженный участок, слегка втирая, 2-4 раза в сутки (при необходимости чаще). В случае нанесения на инфицированную поверхность кожи, ее следует предварительно обработать любым антисептиком. **Не наносить на мокнущие раны.**
	валидол	4 таблетки	**Показания**: Функциональные кардиалгии, синдром «укачивания» (тошнота, рвота при морской и воздушной болезни). **Применение:** по 1 таблетке 2-3 раза в день, под язык, до полного рассасывания
	пинцет	1 шт.	
	личная аптечка		
	бинт стерильный 7х14 см	2 шт.	
	салфетки марлевые стерильные 16х14 см	1 шт.	
	салфетки марлевые стерильные 5х5 см	1 шт.	
	хлоргексидин 0,05% 100 мл	1 флакон	
	пластырь бактерицидный (пластиночки)	1 набор	
	перчатки	1 пара	
	эластичный бинт 1,5х8 см	1 шт	

от чего	средство	кол-во	инструкция по применению
	крем от солнца	1 тюбик	
	гигиеническая помада	1 шт.	
	таблетки от горла	10 шт.	
	капли в нос (если есть склонность и необходимость)	1 шт.	
	любимые лекарства		