

Состав медицинской аптечки

Наименование	Кол-во	Назначение	Дозировки и когда принимать
Наружные ранозаживляющие, антисептические			
Хлоргексидин	2 шт. – 100 мл	для обеззараживания любых поверхностей, слизистых и кожных покровов	наносят на поражённую поверхность кожи
Йод	1 фл. (5 мл)	обработка царапин, кожи вокруг ран, йодовая сетка при растяжениях и ушибах	сразу после обработки раны хлоргексидином
Перевязочные средства			
Бинт марлевый мед. стерильный 7*14	3 шт.	наложение повязки на рану	
Салфетки марлевые стерильные 14*16	2 уп.	для остановки кровотечения	
Пластырь рулонный (ширина 3 см)	1 шт.	для фиксации повязки	
Пластырь в пластинках водостойкий	15 шт.	защита мелких ран от проникновения болезнетворных бактерий. Защита мозолей	
Ватные диски и палочки	20+20	диски для очистки ран, палочки для нанесения йода	
Травмы, растяжения, ушибы, ожоги			
Пантенол крем	1 туба - 45 мл	стимулирует регенерацию кожи. Нарушения целостности кожных покровов, вызванные механическими, химическими, температурными факторами	наносят на поверхность кожи
Фастум гель	1 туба - 50 г.	при боли и воспалении в спине, шее, мышцах и суставах	наносят на поверхность кожи
Болеутоляющее			
Ибупрофен, 200 мг	10 таб.	вирусные инфекционные заболевания, зубная боль и головные боли, мышечные и суставные боли; интенсивные боли при растяжениях, ушибах и спортивных травмах; жаропонижающее	после еды. Суточная доза 1200 мг., разделенных на 3 или 4 приема.
МИГ 400 (400 мг)	10 таб.	вирусные инфекционные заболевания, зубная боль и головные боли, мышечные и суставные боли; интенсивные боли при растяжениях, ушибах и спортивных травмах; жаропонижающее	после еды. Суточная доза 1200 мг., разделенных на 3 или 4 приема.
Кетанов, 10 мг	5 таб.	болевого синдром сильной и умеренной выраженности	однократная доза - 10 мг
ЖКТ			
Ренни	12 шт.	изжога, кислая отрыжка, периодические боли в области желудка, чувство переполнения или тяжести	при появлении симптомов 1-2 таб. следует разжевать (или держать во рту до полного растворения)
Смекта	15 шт.	диарея, нарушение режима питания и качественного состава пищи, гастрит	1 пакетик 3 раза в сутки. Содержимое пакетика растворяют в воде.

Фильтрум-сти	20 таб.	острые и хронические заболевания ЖКТ (пищевая токсикоинфекция, диарея, дизентерия, дисбактериоз)	внутри, за 1-1.5 ч до приема пищи, 3-4 раза в день по 2-3 таб., 2-3 дня
Средства против насекомых			
Аэрозоль GARDEX EXTREME от клещей, 150 мл	1 шт.	Защищает от всех летающих кровососущих насекомых (комаров, москитов, слепней, мокрецов, мошек, блох), а также от таежных и лесных клещей.	От комаров: распылите средство на ладонь и нанесите, не втирая, на открытые участки тела не более 1 раза в сутки. От клещей: обработайте одежду до легкого увлажнения. Используйте вещи после полного высыхания.
Аэрозоль GARDEX EXTREME от всех летающих кровососущих насекомых и клещей, 150 мл	1 шт.		
MOSQUITALL (МОСКИТОЛ) Спрей «Профессиональная защита. На дикой природе», 50мл	1 шт.	Средство для защиты от укусов комаров, мокрецов, москитов и других насекомых на открытом воздухе	Равномерно распыляется как на открытые участки кожи, так и для большей эффективности – на одежду.
Противопростудные			
-	-	-	-
Антибиотики			
-	-	-	-
Дополнительно			
термометр электронный	1 шт.		
ножницы маникюрные	1 шт.		
перчатки медицинские	1 пара		
пинцет	1 шт.		
контейнер для лекарств	1 шт.		